

三个多倍体猕猴桃基因组 survey 分析及系统进化研究

周嘉¹, 王飞飞^{1,2}, 仲伟敏¹, 齐勇¹, 刘青¹, 史斌斌¹, 张晟¹, 牛歆雨², 郑乾明¹, 唐冬梅^{1*}

(¹贵州省农业科学院贵州省果树科学研究所, 贵阳 550006; ²西藏农牧学院植物科学学院, 西藏林芝 860000)

摘要: 【目的】全面了解多倍体猕猴桃种质资源的染色体倍性和基因组特征, 并分析其在猕猴桃属植物中的系统进化关系, 以为多倍体猕猴桃全基因组组装提供参考。【方法】基于流式细胞术分析中华猕猴桃 AcD2301 (*Actinidia chinensis*)、软枣猕猴桃 AcD2302 (*Actinidia arguta*)、对萼猕猴桃 AcD2303 (*Actinidia valvata*) 染色体倍性, 利用 Illumina 二代测序平台开展基因组 survey 分析, 并基于 SNP 构建 15 种猕猴桃属植物系统进化树。【结果】中华猕猴桃 AcD2301、软枣猕猴桃 AcD2302、对萼猕猴桃 AcD2303 的染色体倍性分别为四倍体、四倍体、六倍体, 与 survey 分析结果一致。K-mer 分析预测中华猕猴桃 AcD2301、软枣猕猴桃 AcD2302、对萼猕猴桃 AcD2303 单套基因组大小分别约为 626 Mb、668 Mb、585 Mb, 杂合度为 3.00%、3.30%、8.06%, 重复序列比例 43.70%、45.30%、40.7%。系统进化树显示软枣猕猴桃与对萼猕猴桃亲缘关系较近, 且均与中华猕猴桃独立进化而来。【结论】分析了中华猕猴桃 AcD2301、软枣猕猴桃 AcD2302、对萼猕猴桃 AcD2303 的染色体倍性、基因组大小和系统进化关系, 为将来开展的多倍体猕猴桃全基因组测序提供参考, 也为深入研究猕猴桃多倍化和系统进化提供了理论支持。

关键词: 猕猴桃; 基因组 survey 分析; 基因组大小; 系统进化

中图分类号: S663.4 文献标志码: A 文章编号: 1009-9980(2024)11-0001-08

Survey analysis and phylogenetic study of three polyploid kiwifruit genomes

Zhou Jia¹, Wang Feifei^{1,2}, Zhong Weimin¹, Qi Yong¹,

Liu Qing¹, Shi Binbin¹, Zhang Sheng¹, Niu Xinyu², Zheng Qainming¹, Tang Dongmei^{1*}

(*Guizhou Fruit Science Research Institute, Guizhou Academy of Agricultural Sciences, Guiyang 550006, Guizhou, China; 2College of Plant Sciences, Tibet Agricultural and Animal Husbandry College, Linzhi 860000, Tibet, China*)

Abstract: 【Purpose】 Plant polyploidization is the evolution of adapting to environmental changes and protecting their own population development. The polyploidization of kiwifruit will double its chromosome number and affect the structure and function of its genome, thereby enriching the genetic diversity of kiwifruit. To comprehensively understand the chromosomal ploidy and genomic characteristics of polyploid kiwifruit germplasm resources, and analyze their systematic

收稿日期: 2024-09-23 接受日期: 2024-10-31

基金项目: 黔科合支撑[2023]一般 045, 黔果树所青年基金[2023]4 号, 国家现代农业产业技术体系项目(CARS-26), 筑科合同[2023]2-3 号, 黔科合重大专项字[2024]026

作者简介: 周嘉, 助理研究员, 硕士, 主要从事猕猴桃遗传育种研究。Tel: 13017395475, E-mail: zhoujia4301@qq.com

*通信作者 Author for correspondence. Tel: 15885549760, E-mail: 89368775@qq.com

evolutionary relationships in kiwifruit. **【Methods】**This study analyzed the chromosome ploidy of AcD2301 (*Actinidia chinensis*), AcD2302 (*Actinidia arguta*) and AcD2303 (*Actinidia valvata*) with reference to the diploid *Actinidia chinensis* Hongyang. The samples were analyzed by flow cytometry on the CyFlow Space flow cytometer after being lysed by CyStar UV Precise P kit and dyed by DAPI fluorescent dye in the dark. The total genomic DNA of kiwifruit was extracted by CTAB method, and then electrophoresis was conducted by 0.8% agarose gel. DNA quality was detected with UV spectrophotometer. Use the second-generation sequencing technology Illumina NovaSeq sequencing platform to perform double end sequencing on the sample library. Use software such as FastP to view the distribution of base quality, average error rate distribution of reads, and base content distribution of reads sequencing. Filter the raw data with adapters and low-quality reads to obtain high-quality sequences, and compare them with nucleic acid databases. High quality sequencing data was generated using Jellyfish (version 2.3.0) software k-mer19 to generate K-mer frequency tables, and genome size, heterozygosity, and repeatability were estimated using the GenomeScope 2. The next-generation sequencing data of kiwifruit, which have been published in the NGDC and NCBI databases, were compared with the reference genome *Actinidia chinensis* 'Hongyang' v4.0. SNP calling was performed using GATK software, and the Maximum likelihood algorithm in fastTree software was used to construct phylogenetic trees of 15 kiwifruit species, including *Actinidia chinensis*, *Actinidia arguta* and *Actinidia valvata*.

【Result】 The samples were subjected to flow cytometry analysis, and the peak values of the diploid 'Hongyang' kiwifruit were compared with the reference species. The chromosome ploidy of AcD2301 and AcD2302 were both tetraploid, while the chromosome ploidy of AcD2303 was hexaploid. The subsequent genome survey analysis results were consistent with this. The total genomic DNA of the sample was extracted by CTAB. After being detected, the AcD2301, AcD2302 and AcD2303 gene DNA were sequenced by the Illumina NovaSeq sequencing platform. Sequencing yielded raw data of 162.91 Gb, 139.74 Gb, and 142.44 Gb, followed by filtering to obtain high-quality data of 160.64 Gb, 138.16 Gb, and 140.73 Gb. The sequencing quality assessment showed that the Q20 and Q30 values of AcD2301 were 96.95% and 91.91%, respectively. The Q20 and Q30 values of AcD2302 were 97.09% and 92.07%, respectively. The Q20 and Q30 values of AcD2303 were 96.80% and 91.43%, respectively; The GC contents are approximately 37.20%, 36.77%, and 36.15%, respectively. The sequencing data quality values are all greater than 35, and the base error rates are all less than 0.045, indicating that the genome reads have high quality and can be used for subsequent analysis. Randomly select reads from the sequencing data of AcD2301, AcD2302, and AcD2303 and compare them with the nucleic acid library (NT library). The results show that the randomly selected reads can all be compared with the genome of kiwifruit plants, indicating that there is no contamination in the sequencing data.

Through K-mer analysis of the kiwifruit genome data after quality control, AcD2301 estimated the genome size to be 626 Mb, heterozygosity to be 3.00%, and repeat sequence ratio to be 43.70%; The estimated size of the AcD2302 genome is 668 Mb, with a heterozygosity of 3.30% and a repeat sequence ratio of 45.30%; The estimated genome size of AcD2303 is 585Mb, with a heterozygosity of 8.06% and a repeat sequence ratio of 40.7%. In addition, the support rates for homologous tetraploids of AcD2301 and AcD2302 were 97% and 96.7%, respectively. To analyze the evolutionary relationship of kiwifruit plants, SNP sequences were screened from the second-generation sequencing data of 15 kiwifruit, including AcD2301, AcD2302, and AcD2303. The Maximum likelihood algorithm was used to construct a phylogenetic tree. The results showed that the 15 kiwifruit plants were divided into three major evolutionary branches, with *Actinidia chinensis* AcD2301 as an independent branch, *Actinidia chinensis* 'Donghong' as another independent branch, and the remaining 13 kiwifruit species forming one evolutionary branch. *Actinidia chinensis* var. *deliciosa* in the third evolutionary branch is a small evolutionary branch, while the other 12 kiwifruit species form a small evolutionary branch. For the latter, *Actinidia hubeiensis* is a separate group; The remaining 11 kiwifruit species are grouped together, with the 6 kiwifruit species in the net fruit group clustered into a small evolutionary branch, while the 9 kiwifruit species in the remaining branches are all part of the spotted fruit group. From this, it can be seen that AcD2302, which belongs to the net fruit group, is closely related to AcD2303, and both have evolved independently from AcD2301 in the spotted fruit group. 【Conclusion】 The chromosome ploidy, genome size, and phylogenetic relationships of AcD2301, AcD2302 and AcD2303 were analyzed, providing reference for future polyploid kiwifruit whole genome sequencing and theoretical support for further research on kiwifruit polyploidization and phylogenetic relationships.

Key words: kiwi; Genome survey analysis; Genome size; System evolution

猕猴桃 (*Actinidia* spp.) 是猕猴桃科 (Actinidiaceae) 猕猴桃属 (*Actinidia* Lindl.) 植物, 是 20 世纪初开始人工驯化栽培的特色经济果树, 由于果实风味独特、营养丰富、维生素 C 含量高等优点, 被誉为水果之王且深受广大消费者青睐^[1-2]。2024 年联合国粮农组织 FAO (<https://www.fao.org/home/zh/>) 统计数据显示, 截至 2022 年世界猕猴桃采收面积 28.61 万 hm², 产量 429.15 万 t, 是全球性重要的水果产业。其中中国猕猴桃产量约占世界猕猴桃总产量的 2/3, 已成为我国重要的特色水果产业之一。猕猴桃为功能性雌雄异株植物, 起源和分布中心均在我国, 是广大山区常见的一种水果, 生长在路旁、林中、水沟边、灌丛中, 自然状态下存在着广泛的种间和种内杂交现象, 造成了猕猴桃属植物复杂的形态结构变异。在猕猴桃属植物中, 多倍化现象普遍存在, 例如已知的主栽品种中华猕猴桃红阳、枣猕猴桃魁绿、味猕猴桃贵长分别为二、四、六倍体。此外, 猕猴桃种内染色体倍性变异也较为常见,

不同倍性材料在生态适应^[3]、抗逆^[4]及果实品质^[5]方面存在显著差异。猕猴桃多倍化是适应环境变化保护自身种群发展的进化,不仅使猕猴桃的染色体数目加倍,还影响其基因组的结构和功能,从而丰富猕猴桃遗传多样性^[6]。

随着基因组学时代的到来和发展,测序成本不断降低,高通量测序已被广泛应用于植物基因组测序中。在猕猴桃属植物中,中华猕猴桃(*Actinidia chinensis*)^[7]、毛花猕猴桃(*Actinidia eriantha*)^[8]、阔叶猕猴桃(*Actinidia latifolia*)^[9]、山梨猕猴桃(*Actinidia rufa*)^[10]、软枣猕猴桃(*Actinidia arguta*)^[11]、长叶猕猴桃(*Actinidia hemsleyana*)^[12]、葛枣猕猴桃(*Actinidia polygama*)^[10]等基因组已有报道,为其他猕猴桃属植物的全基因组测序、重要性状解析和遗传改良等工作奠定了基础^[13]。然而中华猕猴桃、美味猕猴桃、软枣猕猴桃等主要栽培利用的物种普遍存在多倍化的现象,尽管不同倍性种质的基因组信息有共性之处,但多倍体猕猴桃的全基因组信息仍有待解析^[14-15]。此外,对对萼猕猴桃作为新型猕猴桃砧木,具备较好的抗涝、抗寒、抗病能力,在产区中也已经得到较好的推广^[16],但缺乏其基因组信息,阻碍了对其重要性状解析的基础。因此,考察中华猕猴桃、软枣猕猴桃、对萼猕猴桃的倍性及基因组信息对后续指导多倍体基因组的组装和辅助其他相关研究具有十分重要的意义。

笔者在本研究中选取野生种质中华猕猴桃 AcD2301 (*Actinidia chinensis*)、软枣猕猴桃 AcD2302 (*Actinidia arguta*)、对萼猕猴桃 AcD2303 (*Actinidia valvata*) 进行多倍体猕猴桃基因组 survey 分析及系统进化研究,通过流式细胞术、K-mer 分析和系统进化树构建,进行染色体倍性、物种杂合率、基因组重复序列比例和基因组大小的评估及系统进化关系研究,以期多倍体猕猴桃全基因组组装提供参考,也为深入研究猕猴桃多倍化和系统进化提供了理论支持。

1 材料和方法

1.1 试验材料

试验材料中华猕猴桃 AcD2301、软枣猕猴桃 AcD2302、对萼猕猴桃 AcD2303 均为野生资源(表 1),保存于贵州省农业科学院果树科学研究所百宜落叶果树试验基地。试验样品采集,剪取顶端幼嫩叶片,液氮速冻后置于-80 °C超低温冰箱保存备用。

表 1 样品采集信息

Table 1 Sample collection information

样品名称	性别	采样时间	采样地点
Sample name	Sexuality	Sampling time	Sampling site
中华猕猴桃 AcD2301	雌 Female	2023 年 5 月	贵州省贵阳市
<i>Actinidia chinensis</i> AcD2301		May, 2023	Guiyang, Guizhou
软枣猕猴桃 AcD2302	雌 Female	2023 年 5 月	贵州省贵阳市
<i>Actinidia arguta</i> AcD2302		May, 2023	Guiyang, Guizhou
对萼猕猴桃 AcD2303	两性花	2023 年 5 月	贵州省贵阳市
<i>Actinidia valvata</i> AcD2303	Bisexual flower	May, 2023	Guiyang, Guizhou

1.2 试验方法

1.2.1 染色体倍性检测

以二倍体红阳猕猴桃 (*Actinidia chinensis* var. Hongyang, 2X=58) 为内参, 采用流式细胞术进行染色体倍性检测^[17]。分别称取 AcD2301、AcD2302 和 AcD2303 新鲜顶端叶片 0.2 g, 置于培养皿中, 用 CyStain UV Precise P 试剂盒进行细胞核裂解, 提取完成后用 50 μ m Celltrics 滤网过滤至样品管中, 加入 DAPI 荧光染液避光染色 2 min 后在 CyFlow Space 流式细胞仪上进行流式细胞术测试, 用 FloMax 软件分析核悬浮液。

1.2.2 DNA 提取及测序

采用 CTAB 法提取猕猴桃基因组总 DNA, 并通过 0.8% 琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 提取质量, 同时采用紫外分光光度计对 DNA 进行定量。利用第二代测序技术 Illumina NovaSeq 测序平台对样本文库进行双末端测序。采用 fastp^[18] 等软件查看碱基质量分布、Reads 平均错误率分布、Reads 测序碱基含量分布, 原始数据过滤接头和低质量 reads 获得高质量序列, 并与核酸库进行比对, 排除外源物种污染。

1.2.3 基因组 Survey 分析

高质量测序数据基于 jellyfish (version 2.3.0) 软件设置 K-mer 为 19 生成 K-mer 频数表和频率直方图, 统计总 K-mer 数、唯一 K-mer 数等, 并运用 GenomeScope 2 工具进行基因组大小、杂合度和重复序列比例的估计^[19-20]。

1.2.4 基于 SNP 的系统进化树构建

基于自测数据 (AcD2301、AcD2302、AcD2303) 和公共数据库 (NGDC、NCBI) 下载部分已公布的猕猴桃二代测序数据 (表 2), 在贵州果树所生物信息学分析平台进行系统进化分析, 与参考基因组红阳 v4.0^[21] 进行比对, 利用 GATK 软件^[22] 进行 SNP calling (仅保留二等位基因), 用 fastTree 软件中的 Maximum likelihood 算法构建系统进化树, 并将树文件进行可视化。

表 2 猕猴桃属植物种名及拉丁文名称

Table 2 Kiwifruit plant species name and Latin name

编号	种名	拉丁文名称	数据来源
numbering	species name	Latin name	data sources
AcD2301	中华猕猴桃	<i>Actinidia chinensis</i>	自测数据 Self-test data
AcD2302	软枣猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i>	自测数据 Self-test data
AcD2303	对萼猕猴桃	<i>Actinidia valvata</i>	自测数据 Self-test data
CRR635714	中华猕猴桃东红	<i>Actinidia chinensis</i> var. Donghong	NGDC
CRR635715	阔叶猕猴桃	<i>Actinidia latifolia</i>	NGDC
SRR3543582	美味猕猴桃	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i>	NCBI
SRR18177732	湖北猕猴桃	<i>Actinidia hubeiensis</i>	NCBI
SRR3723918	浙江猕猴桃	<i>Actinidia zhejiangensis</i>	NCBI
SRR3705798	黄毛猕猴桃	<i>Actinidia fulvicoma</i>	NCBI
SRR3705797	毛花猕猴桃	<i>Actinidia eriantha</i>	NCBI
SRR3723917	山梨猕猴桃	<i>Actinidia rufa</i>	NCBI

SRR3407085	软枣猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i>	NCBI
SRR3474219	葛枣猕猴桃	<i>Actinidia polygama</i>	NCBI
SRR3474216	大籽猕猴桃	<i>Actinidia macrosperma</i>	NCBI
SRR3474220	对萼猕猴桃	<i>Actinidia valvata</i>	NCBI

注：国家生物信息中心（NGDC，中国）、National Center for Biotechnology Information（NCBI，美国）。

Note: National Center for Biotechnology Information (NGDC, China)、National Center for Biotechnology Information (NCBI, USA).

2 结果与分析

2.1 猕猴桃染色体倍性分析

以二倍体红阳猕猴桃 (*Actinidia chinensis* var. Hongyang, $2n=58$) 为内参，分析 3 份猕猴桃样品的倍性，图 1 展示为猕猴桃多倍体样品倍性的流式直方图。其流式直方图中横坐标代表荧光强度，纵坐标代表细胞数量，荧光强度与 DNA 含量成正比，即峰值的位置反应测试样品的倍性。根据内参物种二倍体红阳猕猴桃 (图 1-A) 的峰值比较，AcD2301 (图 1-B) 和 AcD2302 (图 1-C) 的染色体倍性均为四倍体，而 AcD2303 (图 1-D) 染色体倍性为六倍体，流式细胞术测得染色体倍性结果与后续全基因组测序结果一致，图中杂峰的原因可能为部分细胞核降解造成。




图 1 猕猴桃多倍体流式直方图

Fig. 1 Kiwi polyploid flow cytometry histogram

2.2 猕猴桃基因组测序及质控

通过二代 Illumina NovaSeq 测序平台对 AcD2301、AcD2302 和 AcD2303 基因 DNA 进行测序，分别获得 162.91 Gb、139.74 Gb 和 142.44 Gb 原始测序数据，经过过滤后分别获得 160.64Gb、138.16 Gb 和 140.73 Gb 高质量测序数据；测序的质量评估结果显示，AcD2301 的 Q20、Q30 值分别为 96.95%、91.91%，AcD2302 的 Q20、Q30 值分别为 97.09%、92.07%，AcD2303 的 Q20、Q30 值分别为 96.80%、91.43%，表明基因组数据良好，可用于后续分析。AcD2301、AcD2302 和 AcD2303 基因 GC 含量分别约为 37.20%，36.77%和 36.15% (表 3)。

AcD2301 (图 2-A、图 3-A)、AcD2302 (图 2-B、图 3-B) 和 AcD2303 (图 2-C、图 3-C) 基因组中大部分测序数据质量值均大于 35 (图 2), 其碱基错误率均小于 0.045 (图 3), 表明其基因组测序的 Reads 质量较高, 测序结果可信度较高。

表 3 基因组测序数据统计表

Table 3 Statistical table of genome sequencing data

样品	AcD2301	AcD2302	AcD2303
总 Reads 数	1078845806	925411346	943316252
The total number of reads			
总碱基数	162905716706	139737113246	142440754052
Total number of bases /bp			
过滤后 Reads 数	1067883632	916913380	934022544
过滤后碱基/bp	160639029587	138162662210	140726147170
Q20 rate/%	96.95	97.09	96.80
Q30 rate/%	91.91	92.07	91.43
GC/%	37.20	36.77	36.15




图 2 单碱基质量分布

Fig. 2 Single base quality distribution




图 3 Reads 平均错误率分布

Fig. 3 Distribution of average error rate of reads

2.3 猕猴桃基因组测序数据与 NT 数据库比对

进一步从 AcD2301、AcD2302 和 AcD2303 基因组测序数据中随机抽取 10 000 条 Reads 数据使用 blast 软件与核酸库 (NT 库) 进行比对, 挑选最优比对结果按物种统计 (表 4), 结果显示随机选取 Reads 均能比对上猕猴桃属植物基因组, 表明此次测序的基因组数据不存

在污染，部分样本与核酸库比对率较低的原因与取样大小有关。

表 4 NT 比对结果统计

Table 4 NT comparison results statistics

物种名 Species name	AcD2301	AcD2302	AcD2303
	reads 数/比率	reads 数/比率	reads 数/比率
	The number of reads / ratio	The number of reads / ratio	The number of reads / ratio
中华猕猴桃 <i>Actinidia chinensis</i>	865/8.65	636/6.36	445/4.45
茶树 <i>Camellia sinensis</i>	214/2.14	188/1.88	183/1.83
软枣猕猴桃 <i>Actinidia arguta</i>	-	296/2.96	-
小叶猕猴桃 <i>Actinidia lanceolata</i>	138/1.38	144/1.44	108/1.08
黑蕊猕猴桃 <i>Actinidia melanandra</i>	85/0.85	-	-
对萼猕猴桃 <i>Actinidia valvata</i>	-	-	101/1.01
山梨猕猴桃 <i>Actinidia rufa</i>	68/0.68	101/1.01	67/0.67
君迁子 <i>Diospyros lotus</i>	45/0.45	46/0.46	-
葛枣猕猴桃 <i>Actinidia polygama</i>	-	-	61/0.61

2.4 猕猴桃基因组 survey 分析

高质量数据通过 K-mer 分析，预估物种基因组大小，并对物种的杂合度、重复情况进行分析。通过对质控后的猕猴桃基因组数据进行 K-mer 分析（图 4、表 5）得，AcD2301（图 4-A）预估单套基因组大小为 626 Mb，杂合度为 3.00%，重复序列比例 43.70%；AcD2302（图 4-B）预估单套基因组大小为 668 Mb，杂合度为 3.30%，重复序列比例 45.30%；AcD2303（图 4-C）预估单套基因组大小为 585 Mb，杂合度为 8.06%，重复序列比例 40.7%。基于猕猴桃基因组 survey 数据分析得 AcD2301（图 4-A）同源四倍体支持率为 97%，AcD2302（图 4-B）同源四倍体支持率为 96.7%。




图 4 K-mer 分布曲线

Fig. 4 K-mer distribution curve diagram

表 5 基于 19-kmer 基因组信息估计统计表


Table 5 Estimated statistical table based on 19-kmer genome information

类型 Type	AcD2301	AcD2302	AcD2303
K 个碱基的序列 Sequence of K bases	19	19	19
K-mer 分布图的峰值	104	85.8	67.6

The peak of K-mer distribution map			
杂合度 Heterozygosity/%	3.00	3.30	8.06
基因组大小 Genome size/Mb	626	668	585
重复序列比例	43.70%	45.30%	40.7%
Repeat sequence ratio /%			
使用数据量	160.6	138	141
Amount of data used /G			
数据量乘数	256	206	240
Quantity of data multiplier			

2.5 猕猴桃属植物进化树分析

为分析猕猴桃属植物的进化关系，筛选了已报道的中华猕猴桃东红、美味猕猴桃和湖北猕猴桃等 15 种猕猴桃属植物的二代测序数据中的 SNP 序列，采用 Maximum likelihood 算法构建系统进化树。该系统进化树显示（图 5），15 种猕猴桃属植物分为三大进化分支，且均得到了较好的支持，其中中华猕猴桃 AcD2301 为一个独立进化枝，东红猕猴桃为另一个独立进化枝，其余 13 种猕猴桃组成一个进化枝。在第三个进化分支中的美味猕猴桃为一个小进化枝，其余 12 种猕猴桃组成一个小进化分支。对于后者湖北猕猴桃单独一组；其余 11 种猕猴桃为一组，其中净果组的 6 种猕猴桃（软枣猕猴桃 AcD2302、软枣猕猴桃、葛枣猕猴桃、大籽猕猴桃、对萼猕猴桃 AcD2303、对萼猕猴桃）聚为一个小进化分支，而其余分支的 9 种猕猴桃均为斑果组。



系统进化树构建中下载并使用已公布的猕猴桃二代测序数据有东红猕猴桃、阔叶猕猴桃 (<https://ngdc.cncb.ac.cn>)；美味猕猴桃、湖北猕猴桃、浙江猕猴桃、黄毛猕猴桃、毛花猕猴桃、山梨猕猴桃、软枣猕猴桃、葛枣猕猴桃、大籽猕猴桃、对萼猕猴桃 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov>)。

In the construction of phylogenetic tree, the published next-generation sequencing data of kiwifruit were downloaded and used, including *Actinidia chinensis* Donghong, *Actinidia latifolia* (<https://ngdc.cncb.ac.cn>); *Actinidia chinensis* var. *deliciosa*, *Actinidia hubeiensis*, *Actinidia zhejiangensis*, *Actinidia fulvicoma*, *Actinidia eriantha*, *Actinidia rufa*, *Actinidia arguta*, *Actinidia polygama*, *Actinidia macrosperma*, and *Actinidia valvata* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov>).

图 5 猕猴桃属植物系统进化树

Fig. 5 The phylogenetic tree of kiwifruit plants

3 讨论

多倍化是推动植物遗传多样性和适应环境变化的重要机制之一，在植物中广泛存在，其中猕猴桃属植物中多倍化现象非常普遍。猕猴桃多倍化表现为体细胞均增大，果型更加圆润饱满，叶片颜色更深、表皮毛被明显增多、产量高、抗性强等特征^[3-5]。尽管以往的研究已经从很大程度上揭示了猕猴桃属物种的基因组信息以及该物种的主要倍性，但仍有部分物种尚未明确。本研究中就基于流式细胞术分析 AcD2301、AcD2302、AcD2303 的染色体倍性分别为四倍体、四倍体和六倍体。而基于猕猴桃基因组 survey 数据分析所得 AcD2301 同源四倍体支持率为 97%，AcD2302 同源四倍体支持率为 96.7% 的倍性，与上述结果基本一致。以上工作为进一步丰富猕猴桃物种基因组奠定了基础。

基于测序技术解析全基因组信息，为植物起源、进化、生殖、发育、抗性和性别调控等研究提供了基础。不同种类的植物基因组大小相差很大，根据目前已经公布的基因组数据中梅溪蕨 (*Tmesipteris oblancoolata*) 的基因组大小约 160.45 Gb，而旋刺草 (*Genlisea aurea*) 的基因组大小仅为约 0.063 6 Gb，相差约 2500 倍^[23]。目前主要采用流式细胞术和高通量测序技术等方法评估植物的基因组大小，例如在四数九里香^[24]、白及^[25]、荆芥^[26]等多种植物基因组大小特征评估中都有应用。流式细胞术是通过测量细胞中 DNA 与荧光染料结合后发出的荧光信号强度，来间接预估基因组大小的相对值，而基因组 survey 分析是利用高通量测序技术对植物基因组进行测序和直接获取基因组大小等信息的测序技术，这两种技术结合起来评估基因组大小和特征相对可靠^[27]。已报道猕猴桃属植物的基因组大小通常在 600 Mb 左右，中华猕猴桃为 610.1 Mb^[7]，毛花猕猴桃为 619.3 Mb 和 611.7 Mb^[8]等，本研究结果所揭示的单套基因组大小较为相近，AcD2301 为 626 Mb、AcD2302 为 668 Mb、AcD2303 为 585 Mb，均都在 600 Mb 左右，但基因组具体大小又取决于不同的种质资源。

基因组学研究还可以揭示物种的遗传多样性、基因组演化历程以及基因功能等，通过构建系统进化树可以直观地展现亲缘关系和进化历程^[28]。已有研究通过 UPGMA 聚类分析得到星毛组的中华猕猴桃与净果组的软枣猕猴桃亲缘关系较远^[29]，并且与净果组的对萼猕猴桃亲缘关系也较远^[30]，由此推测同为净果组的软枣猕猴桃和对萼猕猴桃亲缘关系较近，并均与星毛组的中华猕猴桃亲缘关系较远。本研究中构建的猕猴桃属植物系统进化树，证明了软枣猕猴桃 AcD2302 与对萼猕猴桃 AcD2303 亲缘关系较近，且均与中华猕猴桃 AcD2301 独立进化而来的结果一致，为阐明物种进化关系及基因组的内在结构奠定基础。

4 结论

中华猕猴桃 AcD2301、软枣猕猴桃 AcD2302、对萼猕猴桃 AcD2303 的染色体倍性分别为四倍体、四倍体和六倍体，与全基因组测序预估结果一致；基于全基因组 survey 分析预测基因组大小分别为 626Mb、668Mb、585Mb，杂合度为 3.00%、3.30%、8.06%，重复序列比例 43.70%、45.30%、40.7%。SNP 系统进化树发现软枣猕猴桃 AcD2302 与对萼猕猴桃 AcD2303 亲缘关系较近，且均与中华猕猴桃 AcD2301 独立进化而来。

参考文献 References:

- [1] 黄宏文. 猕猴桃属 分类 资源 驯化 栽培[M]. 北京: 科学出版社, 2013.
HUANG Hongwen. *Actinidia taxonomy germplasm domestication cultivation*[M]. Beijing: Science Press, 2013.
- [2] 钟彩虹. 猕猴桃栽培理论与生产技术[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
ZHONG Caihong. *Kiwifruit cultivation theory and production technology*[M]. Beijing: Science Press, 2020.
- [3] 刘彩艳, 李大卫, 杨石建, 潘志立, 金若涵, 陈芳, 郭雯. 不同倍性猕猴桃的适生区预测及生态位分化[J]. 应用生态学报, 2021, 32(9): 3167-3176.
LIU Caiyan, LI Dawei, YANG Shijian, PAN Zhili, JIN Ruohan, CHEN Fang, GUO Wen. Potential suitable area and niche shift of different ploidy kiwifruit[J]. *Chinese Journal of Applied Ecology*, 2021, 32(9): 3167-3176.
- [4] 金若涵. 不同倍性猕猴桃木质部解剖结构和水分传导功能关系的研究[D]. 昆明: 云南大学, 2022.
JIN Ruohan. Relationship between xylem anatomical structure and hydraulic function of kiwifruit with different ploidy levels[D]. Kunming: Yunnan University, 2022.
- [5] 李志, 方金豹, 齐秀娟, 林苗苗, 陈锦永, 顾红. 不同倍性雄株对软枣猕猴桃坐果及果实性状的影响[J]. 果树学报, 2016, 33(6): 658-663.
LI Zhi, FANG Jinbao, QI Xiujuan, LIN Miaomiao, CHEN Jinyong, GU Hong. Effects of male plants with different ploidy on the fruit set and fruit characteristics in *Actinidia arguta* kiwifruit[J]. *Journal of Fruit Science*, 2016, 33(6): 658-663.
- [6] 李文萃. 中华猕猴桃和多倍体美味猕猴桃的抗冷基因表达及进化研究[D]. 北京: 中国环境科学研究院, 2024.
LI Wencui. Study on the expression and evolution of cold resistance genes in *Actinidia chinensis* and polyploid *Actinidia deliciosa*[D]. Beijing: Chinese Research Academy of Environmental Sciences, 2024.
- [7] HUANG S X, DING J, DENG D J, TANG W, SUN H H, LIU D Y, ZHANG L, NIU X L, ZHANG X, MENG M, YU J D, LIU J, HAN Y, SHI W, ZHANG D F, CAO S Q, WEI Z J, CUI Y L, XIA Y H, ZENG H P, BAO K, LIN L, MIN Y, ZHANG H, MIAO M, TANG X F, ZHU Y Y, SUI Y, LI G W, SUN H J, YUE J Y, SUN J Q, LIU F F, ZHOU L Q, LEI L, ZHENG X Q, LIU M, HUANG L, SONG J, XU C H, LI J W, YE K Y, ZHONG S L, LU B R, HE G H, XIAO F M, WANG H L, ZHENG H K, FEI Z J, LIU Y S. Draft genome of the kiwifruit *Actinidia chinensis*[J]. *Nature Communications*, 2013, 4: 2640.
- [8] WANG Y Z, DONG M H, WU Y, ZHANG F, REN W M, LIN Y Z, CHEN Q Y, ZHANG S J, YUE J Y, LIU Y S. Telomere-to-telomere and haplotype-resolved genome of the kiwifruit *Actinidia eriantha*[J]. *Molecular Horticulture*, 2023, 3(1): 4.
- [9] HAN X, ZHANG Y L, ZHANG Q, MA N, LIU X Y, TAO W J, LOU Z Y, ZHONG C H, DENG X W, LI D W, HE H. Two haplotype-resolved, gap-free genome assemblies for *Actinidia latifolia* and *Actinidia chinensis* shed light on the regulatory mechanisms of vitamin C and sucrose metabolism in kiwifruit[J]. *Molecular Plant*, 2023, 16(2): 452-470.
- [10] AKAGI T, VARKONYI-GASIC E, SHIRASAWA K, CATANACH A, HENRY I M, MERTTEN D, DATSON P, MASUDA K, FUJITA N, KUWADA E, USHIJIMA K, BEPPU K, ALLAN A C, CHARLESWORTH D, KATAOKA I. Recurrent neo-sex chromosome evolution in kiwifruit[J]. *Nature Plants*, 2023, 9(3): 393-402.
- [11] LU X M, YU X F, LI G Q, QU M H, WANG H, LIU C, MAN Y P, JIANG X H, LI M Z, WANG J, CHEN Q Q, LEI R, ZHAO C C, ZHOU Y Q, JIANG Z W, LI Z Z, ZHENG S, DONG C, WANG B L, SUN Y X, ZHANG H Q, LI J W, MO Q H, ZHANG Y, LOU X, PENG H X, YI Y T, WANG H X, ZHANG X J, WANG Y B, WANG D, LI L, ZHANG Q, WANG W X, LIU Y B, GAO L, WU J H, WANG Y C. Genome

assembly of autotetraploid *Actinidia arguta* highlights adaptive evolution and enables dissection of important economic traits[J]. *Plant Communications*, 2024, 5(6): 100856.

[12] QI X Q, XIE X D, YANG M J, ATAK A, ZHONG C H, LI D W. Characterization of the complete chloroplast genome of *Actinidia hemsleyana*[J]. *Mitochondrial DNA. Part B, Resources*, 2021, 6(11): 3259-3260.

[13] 孙雷明, 方金豹. 我国猕猴桃种质资源的保存与研究利用[J]. *植物遗传资源学报*, 2020, 21(6): 1483-1493.

SUN Leiming, FANG Jinbao. Conservation, research and utilization of kiwifruit germplasm resources in China[J]. *Journal of Plant Genetic Resources*, 2020, 21(6): 1483-1493.

[14] 滕晓梅, 廖川江, 刘畅, 徐雨生. 葡萄叶猕猴桃(猕猴桃科)叶绿体全基因组测序[J]. *种子科技*, 2021, 39(21): 23-25.

TENG Xiaomei, LIAO Chuanjiang, LIU Chang, XU Yusheng. Whole genome sequencing of chloroplasts from *Actinidia chinensis* (Actinidiaceae)[J]. *Seed Science & Technology*, 2021, 39(21): 23-25.

[15] 王连润, 陶磅, 万红, 陈霞, 李坤明, 沙毓沧, 丁仁展. 云南 4 种野生猕猴桃基因组大小测定与比较[J]. *中国南方果树*, 2022, 51(4): 100-103.

WANG Lianrun, TAO Bang, WAN Hong, CHEN Xia, LI Kunming, SHA Yucang, DING Renzhan. Detection and comparison of genome size of four wild kiwifruit varieties from Yunnan[J]. *South China Fruits*, 2022, 51(4): 100-103.

[16] 魏远新, 郭兴利, 张振营, 孙继中, 李金良, 李书林. 对粤猕猴桃新型砧木及其绿枝嫁接关键技术[J]. *北方果树*, 2023(6): 35-36.

WEI Yuanxin, GUO Xingli, ZHANG Zhenying, SUN Jizhong, LI Jinliang, LI Shulin. New rootstock of *Actinidia chinensis* and key technology of green branch grafting[J]. *Northern Fruits*, 2023(6): 35-36.

[17] 吕雅雅, 白事麟, 韩宜洁, 邱娟, 师小军. 基于流式细胞术对棱叶韭染色体的倍性鉴定和基因组大小分析 [J/OL]. *分子植物育种*, 2024[2024-09-11](2024-03-19). <https://link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20240318.1332.006>.

LÜ Yaya, BAI Shilin, HAN Yijie, QIU Juan, SHI Xiaojun. Estimation ploidy and genome size of *Allium caeruleum* Pall. by flow cytometry[J/OL]. *Molecular Plant Breeding*, 2024[2024-09-11] (2024-03-19). <https://link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20240318.1332.006>.

[18] CHEN S F, ZHOU Y Q, CHEN Y R, GU J. Fastp: An ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor[J]. *Bioinformatics*, 2018, 34(17): i884-i890.

[19] MARÇAIS G, KINGSFORD C. A fast, lock-free approach for efficient parallel counting of occurrences of k-mers[J]. *Bioinformatics*, 2011, 27(6): 764-770.

[20] VURTURE G W, SEDLAZECK F J, NATTESTAD M, UNDERWOOD C J, FANG H, GURTOWSKI J, SCHATZ M C. GenomeScope: Fast reference-free genome profiling from short reads[J]. *Bioinformatics*, 2017, 33(14): 2202-2204.

[21] YUE J Y, CHEN Q Y, WANG Y Z, ZHANG L, YE C, WANG X, CAO S, LIN Y Z, HUANG W, XIAN H, QIN H Y, WANG Y L, ZHANG S J, WU Y, WANG S H, YUE Y, LIU Y S. Telomere-to-telomere and gap-free reference genome assembly of the kiwifruit *Actinidia chinensis*[J]. *Horticulture Research*, 2023, 10(2): uhac264.

[22] ZHOU Y, KATHIRESAN N, YU Z C, RIVERA L F, YANG Y J, THIMMA M, MANICKAM K, CHEBOTAROV D, MAULEON R, CHOUGULE K, WEI S, GAO T T, GREEN C D, ZUCCOLO A, XIE W B, WARE D, ZHANG J W, MCNALLY K L, WING R A. A high-performance computational workflow to

- accelerate GATK SNP detection across a 25-genome dataset[J]. *BMC Biology*, 2024, 22(1): 13.
- [23] FERNÁNDEZ P, AMICE R, BRUY D, CHRISTENHUSZ M J M, LEITCH I J, LEITCH A L, POKORNY L, HIDALGO O, PELLICER J. A 160 Gbp fern genome shatters size record for eukaryotes[J]. *iScience*, 2024, 27(6): 109889.
- [24] 邢琴琴, 周韬, 卜家豪, 沈植国, 韩文军. 四数九里香全基因组 Survey 分析[J/OL]. *分子植物育种*, 2023[2024-09-11](2023-12-08). <https://link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20231207.1357.012>.
- XING Qinqin, ZHOU Tao, BU Jiahao, SHEN Zhiguo, HAN Wenjun. Genome Survey Analysis in *Murraya tetramera* Huang[J/OL]. *Molecular Plant Breeding*, 2023[2024-09-11](2023-12-08). <https://link.cnki.net/urlid/46.1068.S.20231207.1357.012>.
- [25] 杨渊, 黄明进, 王大昌, 阮宝丽, 杨秋悦, 杨洋, 罗影子, 覃玉强. 基于流式细胞术与基因组 Survey 分析白及基因组大小及特征[J]. *中成药*, 2023, 45(11): 3677-3682.
- YANG Yuan, HUANG Mingjin, WANG Dachang, RUAN Baoli, YANG Qiuyue, YANG Yang, LUO Yingzi, QIN Yuqiang. Analysis of genome size and characteristics of *Bletilla striata* based on flow cytometry and genomic survey[J]. *Chinese Traditional Patent Medicine*, 2023, 45(11): 3677-3682.
- [26] 姜涛, 刘灵娣, 田伟, 刘铭, 温春秀. 基于流式细胞术和 K-mer 分析的荆芥基因组大小评估[J]. *特产研究*, 2023, 45(6): 1-5.
- JIANG Tao, LIU Lingdi, TIAN Wei, LIU Ming, WEN Chunxiu. Genome-determination of *Nepeta cataria* based on flow cytometry and K-mer analysis[J]. *Special Wild Economic Animal and Plant Research*, 2023, 45(6): 1-5.
- [27] 饶静云, 刘义飞, 黄宏文. 中华猕猴桃不同倍性间杂交后代倍性分离和遗传变异分析[J]. *园艺学报*, 2012, 39(8): 1447-1456.
- RAO Jingyun, LIU Yifei, HUANG Hongwen. Analysis of ploidy segregation and genetic variation of progenies of different interploidy crosses in *Actinidia chinensis*[J]. *Acta Horticulturae Sinica*, 2012, 39(8): 1447-1456.
- [28] LIU Y B, ZHOU Y, CHENG F, ZHOU R C, YANG Y Q, WANG Y C, ZHANG X T, SOLTIS D E, XIAO N W, QUAN Z J, LI J S. Chromosome-level genome of putative autohexaploid *Actinidia deliciosa* provides insights into polyploidisation and evolution[J]. *The Plant Journal*, 2024, 118(1): 73-89.
- [29] 刘娟, 廖明安, 谢玥, 周良强, 李明章. 猕猴桃属 16 个雄性材料遗传多样性的 ISSR 分析[J]. *植物遗传资源学报*, 2015, 16(3): 618-623.
- LIU Juan, LIAO Ming'an, XIE Yue, ZHOU Liangqiang, LI Mingzhang. Genetic diversity of 16 male *Actinidia* cultivars based on ISSR[J]. *Journal of Plant Genetic Resources*, 2015, 16(3): 618-623.
- [30] 张慧, 张世鑫, 吴绍华, 田维敏, 彭小列, 刘世彪. 猕猴桃属 33 份种质资源的全 AFLP 遗传多样性分析[J]. *生物学杂志*, 2018, 35(2): 29-33.
- ZHANG Hui, ZHANG Shixin, WU Shaohua, TIAN Weimin, PENG Xiaolie, LIU Shibiao. Genetic diversity of 33 kiwifruit germplasms based on AFLP markers[J]. *Journal of Biology*, 2018, 35(2): 29-33.